OBSERVATOIRE
CÔTE AQUITAINE

Réseau d'experts au service du littoral

Evolution du trait de côte et aléas mouvements de terrain La côte rocheuse basque

Conférence Cobaty Côte basque / APV Falaise
21 novembre 2013

Christophe Garnier, BRGM Aquitaine (c.garnier@brgm.fr)

Géosciences pour une Terre durable

brgm

Points abordés

- > Contexte géologique général;
- > Subdivision en cellules géomorphologiques;
- > Les processus érosifs et la typologie des mouvements de terrain;
- > Qualification des aléas et positionnement du trait de côte;
- > Démarche en cours;
- > Focus sur la falaise de Miramar à la Chambre d'Amour.

Contexte géologique de la Côte Basque

- Falaise littorale constituée de formations essentiellement **d'origine sédimentaire** (dépôts de milieux marins plus ou moins profonds);
- Strates sédimentaires déformées par la tectonique des plaques (collision des plaques ibérique et européenne), déterminant la configuration géomorphologique complexe actuelle (plissements, fracturation);

Contexte géologique de la Côte Basque

- Terrains les plus anciens d'âge **triasique** (début Secondaire, -250 à -200 MA); régime marin intermittent à l'origine de dépôts de couches de gypse, marnes, sables littoraux. Peu de témoins de ces dépôts (faible extension sur Bidart);
- Pour l'essentiel, terrains d'âge **crétacé** (-145 à -65 MA): flyschs principalement (alternance de calcaires et de marnes – flyschs de Guéthary, de Socoa, d'Hayzabia), mais aussi Marnes de Bidart

Gypse
triasique
(Bidart)

Flyschs à silex
de Guéthary

Marnes de
Bidart

Flyschs marno-
calcaires de
Socoa

Contexte géologique de la Côte Basque

- > Terrains d'âge **tertiaire** (à partir -65MA):
 - Calcaires rosés de Bidart et de la Pointe Ste-Anne, datés du Paléocène (-65 à -55 MA);
 - Marnes de l'Eocène (-55 à -34 MA) depuis la Côte des Basques jusqu'aux falaises de Bidart;
 - Calcaires et marnes gréseuses de la Chambre d'Amour au Rocher de la Vierge (Oligocène, -34 à -23 MA);
- > Terrains d'âge **plio-quadernaire** (<-5MA): alluvions récentes dans les principales vallées (Nivelle, Untxin, Bidassoa, etc), terrasses alluviales affleurant principalement au Nord du littoral basque (jusqu'à Bidart) puis s'amincissant, les dépôts littoraux sableux (apports de l'océan)

Calcaires rosés
(Bidart)

Plage du
Pavillon Royal
(Bidart)

Formations
alluviales du
Pluo-quat
(Bidart)

Calcaires gréseux
de l'Oligocène
(Pte St-Martin)

Typologie géologique du littoral

Subdivision du littoral rocheux basque en cellules géomorphologiques

LEGENDE

Type de morphologie côtière

- 1 stratification horizontale avec couverture de sédiments récents et altérite de faible épaisseur
- 2 stratification déformée et meuble avec couverture récente et altérites
- 3 roche dure et plissée avec couverture récente et altérites
- 4 roche dure et plissée avec altérites au sommet
- 5 roche dure basculée et non plissée
- 6 altérites en reliefs bas
- 7 sables et dunes

Les mécanismes d'érosion

1. L'érosion marine

> **L'érosion marine** peut être divisée en deux parties :

- l'érosion sous-marine (estran)
- l'érosion aérienne (impact de la houle sur la falaise)

l'érosion sous-marine

Les mécanismes d'érosion

2. L'érosion continentale

> **L'érosion continentale** : l'eau continentale est un facteur d'érosion essentiel sur le littoral basque, de par :

- ses actions chimiques et physiques qui provoquent la dégradation des roches (dissolution, altérisation, etc.)
- son action mécanique liée à la pluviométrie (principal facteur déclencheur des instabilités)

Falaises plage de Bernain

Les mécanismes d'érosion

- > Selon les secteurs du littoral basque, les facteurs d'érosion continentaux et marins n'auront pas le même degré d'implication
- > Exemple : Falaises du Cap Saint-Martin
 - Facteurs intrinsèques : verticalité de la falaise, fracturation parallèle au littoral, karst.....
 - Facteurs d'érosion : action de la mer (phénomène de sous-cavage) et action continentale (circulations d'eau dans les terrains)

Secteur de la Villa Nuit de Mai

Secteur de la plage Bernain/Miramar

Facteurs conditionnant l'apparition de mouvements de terrain

Milieu physique (géologie, pente, altération, fracturation, ...) = **facteurs permanents**

+

Déclencheurs et/ou aggravants (eau continentale, dynamique marine, l'action de l'homme,)

=

Apparition d'un mouvement de terrain

Le niveau d'aléa d'une zone donnée traduit la susceptibilité de cette zone à être affectée par un mouvement de terrain

Les différents types de mouvements de terrain

› Les glissements de terrain circulaires – Guéthary (7 500 m³), 2004

› Les glissements / éboulements – Hendaye (8000 m³), 2008

› Les éboulements – Anglet (12000 m³), 1999

› Le fauchage – La Corniche Basque (100 m³)

Les différents types de mouvements de terrain

› Les glissements banc sur banc – La Corniche, Urrugne

› Les glissements coulée de boue – Baie de Loya, Hendaye (2008)

› Glissement / Eboulement – Erretegia, Bidart (novembre 2012, 5000 m³)

Recensement des mouvements de terrain

Répartition des phénomènes d'instabilité

> Evénements de référence datés depuis 1938 avec des volumes mis en jeu compris en 100 et 20 000 m³

Répartition des phénomènes d'instabilité

- Désordre observé
- ▲ Evènement de référence
- ✦ Indice d'instabilité
- Mouvement actif

BRGM

Le recul du trait de côte – une réalité...

Photographie aérienne de l'IGN 1954

Orthophoto littorale de 2000

Google Earth, photographie aérienne 2006

Recul moyen annuel du sommet de falaise entre 1954 et 2006

Etude prospective sur le positionnement du trait de côte et aléas MVT

Démarche régionale

> Contexte:

- Etude stratégique de gestion du trait de côte en Aquitaine;
- Mission confiée par le GIP Littoral Aquitain à l'Observatoire de la Côte Aquitaine (BRGM / ONF);
- Objectifs: cartographie du trait de côte de référence (2009) et des traits de côte aux référence temporelles retenues (2020 et 2040);
- Rendu cartographique à l'échelle régionale, 1/50 000, sans prise en compte des ouvrages de protection existants (à l'exception des ouvrages « majeurs ») → vocation informative;
- Rapport BRGM/RP-59095-FR, août 2011;
- Recul moyen de 20 cm/an (15% environ du littoral rocheux basque > à 20 cm/an)

Etude prospective sur le positionnement du trait de côte et aléas MVT

Limites d'utilisation :

- Données produites pour une analyse à une échelle régionale dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte
- Trait de côte estimé sans prise en compte des ouvrages sauf digues portuaires majeures
- Interprétation interdite sans une lecture préalable de la méthodologie et sans connaissance des hypothèses retenues (notamment pour les ouvrages de protection)
- Diffusion et reproduction interdite

Aléas

Note de valeur des aléas

- Nul à faible
- Faible
- Moyen
- Fort

Aléa 2040
Aléa 2020

Trait de côte

- Projection 2020
- Projection 2040

Limites communales

250 m

Limites d'utilisation :
"Données produites pour une analyse à une échelle régionale dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte. Interprétation interdite sans lecture préalable de la méthodologie et sans connaissance des hypothèses retenues."
- Rapport DUCOMPT-2005-FR -
Diffusion et reproduction autorisées.
Coordonnées : CIP Littoral Aquitain
Producteur : Observatoire Côte Aquitaine (définition de l'alea)
Sogreah (qualification des enjeux)
Fond carte : BD Carthage IGN 2000 /
convention n°3 CIP AOCeB
Echelle 5000/2011

Etude prospective sur le positionnement du trait de côte et aléas MVT

Limites d'utilisation :

- Données produites pour une analyse à une échelle régionale dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte
- Trait de côte estimé sans prise en compte des ouvrages sauf digues portuaires majeures
- Interprétation interdite sans une lecture préalable de la méthodologie et sans connaissance des hypothèses retenues (notamment pour les ouvrages de protection)
- Diffusion et reproduction interdite

Aléas

Note de valeur des aléas

Trait de côte

— Projection 2020
- - - Projection 2040

— Limites communales

250 m

Limites d'utilisation :
"Données produites pour une analyse à une échelle régionale dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte. Interprétation interdite sans lecture préalable de la méthodologie et sans connaissance des hypothèses retenues."
- Rapport SUDGMRF-000205-FR -
Diffusion et reproduction interdites.
Commanditaire : GIP Littoral Aquitain
Production : Observatoire Côte Aquitaine (Définition de l'étude)
Logiciel (qualification des enjeux)
Financement : IED Centre Océan 19435-2008 / convention n°3 GIP AYGaR
Édité le 04/05/2011

Etude prospective sur le positionnement du trait de côte et aléas MVT

Limites d'utilisation :

- Données produites pour une analyse à une échelle régionale dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte
- Trait de côte estimé sans prise en compte des ouvrages sauf digues portuaires majeures
- Interprétation interdite sans une lecture préalable de la méthodologie et sans connaissance des hypothèses retenues (notamment pour les ouvrages de protection)
- Diffusion et reproduction interdite

Aléas

Note de valeur des aléas

Trait de côte

Limites communales

250 m

Limites d'utilisation :
 "Données produites pour une analyse à une échelle régionale dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte. Interprétation interdite sans lecture préalable de la méthodologie et sans connaissance des hypothèses retenues."
 - Rapport SUDMERF-20025-FR -
 Diffusion et reproduction interdites.
 Commanditaire : GIP Littoral Aquitain
 Production : Observatoire Côte Aquitaine (département de l'étude)
 Diagramme (qualification des enjeux)
 Fond cartographique : BD Carthage IGN 19435-2008 / conversion SRS GIP AYGAR
 Edité le 20/05/2011

Etude prospective sur le positionnement du trait de côte et aléas MVT

Démarches locales

> Contexte:

- Conformément au cadre défini par la stratégie régionale de gestion de la frange côtière (GIP LA, 2012), les agglomérations COTE BASQUE ADOUR et SUD PAYS BASQUE ont lancé la mise en œuvre de stratégies locales de gestion;
- Mission confiée au BRGM fin 2012 (partenariat): réalisation de la 1^{ère} étape de ces stratégies locales → étude de positionnement du TDC à échéance +10 / +30 ans et qualification aléas MVT à échelle détaillée (1/ 5 000);
- 2 scénarii pris en compte: maintien des ouvrages de protection en place, effacement de ces ouvrages (sauf ouvrages « majeurs »);
- Avancement: atlas de localisation des ouvrages de protection achevé; atlas TDC / aléas en cours;

Falaises de Miramar à la Chambre d'Amour

- > **Géologie**: calcaires marneux, à pendage subhorizontal. Roches globalement tendres et peu fissurées, mais présence de bancs +/- carbonatés indurés. Couverture de 4 à 12 m environ d'alluvions sablo-graveleuses abritant une nappe;
- > Massif affecté par **karstification** (processus à l'origine de la formation de cavités en arrière de la falaise) → rôle considéré comme non prépondérant dans le mécanisme de démantèlement de la falaise;
- > Quelques **événements historiques** « récents » connus:

2006, 200 m³

Chemin des Sources
Nov. 2005, 200 m³

Falaises de Miramar à la Chambre d'Amour

> Quelques **événements historiques** « récents » connus:

Bld de la Mer
5 Nov. 2005

Villa Nuit de Mai
23 mars 1999

Falaises de Miramar à la Chambre d'Amour

> Quelques **événements historiques** « récents » connus:

Février 1974, 1000 m³

Villa Rayon Vert
06 décembre 1965,
5000 m³

Falaises de Miramar à la Chambre d'Amour

> Quelques **événements historiques** « récents » connus:

2 janvier 2001, 5000 m³

Mai 1985, 2000 m³?

2008

Falaises de Miramar à la Chambre d'Amour

- > **Mode d'évolution:** Evolution par écroulements successifs de pans rocheux de volume variable (quelques mètres à + de 10 m de large);
- > **L'agent moteur principal** est vraisemblablement l'érosion marine (sous-cavage, formation de surplombs). Action globalement secondaire des écoulements d'eaux souterraines ou superficielles, sauf pour la couverture alluviale (mise en charge, perte de cohésion);

Pointe Saint-Martin, plage de Bernain, plage Miramar